

Jan Green Toft

## Vejledning til forældre med børn der skal opereres i fuld bedøvelse

Dit barn skal være **fastende fra mindst 6 timer før mødetidspunktet**. Det betyder, at barnet hverken må spise, drikke mælk, få slik, tyggegummi eller børste tænder i de 6 timer.

Barnet må dog gerne drikke 1-2 glas vand **senest 2- timer før mødetidspunktet**. Dit barn må gerne have tisset af inden operationen.

**OBS! Ved fjernelse af polypper/eftersyn af polypper og skrumpning af mandler anbefaler vi, at man derhjemme 2 timer før mødetid giver dobbelt dosis flydende Panodil eller stikpille (fx Pinex-junior).**

Når I kommer ind på operationsstuen, skal barnet op og ligge på lejet. Narkoselægen giver narkosemiddel på maske over barnets mund og næse. I starten af narkosen vil barnet få ufrivillige muskeltrækninger ca. 1 minut. Det er normalt og kan hverken mærkes eller huskes af barnet.

Du bliver vist ud i venteværelset så snart barnet sover og mens operationen udføres. Når barnet skal til at vågne op, kommer du ind i opvågningsrummet.

Under opvågningen kan der komme en kort periode med uro og gråd. Barnet er stadig under påvirkning af narkosen og husker intet bagefter. Sjældent kan barnet blive overraskende aktivt. Det kan vare op til et par timer.

Efter operationen kan barnet være forkvalmet og kaste op. Barnet er i øvrigt også oftest slapt og træt. Det er derfor praktisk, at der er 2 voksne personer tilstede på hjemvejen.

**Bemærk: I skal selv medbringe tæppe eller lille dyne.**

Mange børn med øre-næse-halssygdomme er forkølede og har lidt feber. Kom under alle omstændigheder og få barnet vurderet. Det er kun meget sjældent nødvendigt at aflyse en operation på grund af anden sygdom.